PATVIRTINTA
Kauno lopšelio-darželio „Šarkelė“
Direktoriaus 2026 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. V -101/1

EPINEFRINO PANAUDOJIMO ANAFILAKSINIO ŠOKO ATVEJU IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Epinefrino panaudojimo anafilaksijos atveju Kauno lopšelyje-darželyje „Šarkelė“ tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato veiksmų organizavimo, epinefrino laikymo, priežiūros, panaudojimo, apskaitos, darbuotojų informavimo ir veiksmų po epinefrino panaudojimo tvarką.
2. Aprašas taikomas visiems Kauno lopšelio-darželio „Šarkelė“ darbuotojams, kurie darbo metu prižiūri, ugdo, moko, lydi ar kitaip atsako už vaikų saugumą.
3. Aprašo tikslas – užtikrinti, kad vaikui ar kitam Kauno lopšelyje-darželyje „Šarkelė“ esančiam asmeniui pasireiškus anafilaksijai būtų nedelsiant atpažinta kritinė būklė, iškviesta skubioji medicinos pagalba ir suteikta pirmoji pagalba, įskaitant epinefrino autoinjektoriaus panaudojimą, kai tai būtina.
4. Aprašas parengtas vadovaujantis:
   4.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2025 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1103 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo, švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“;
   4.2. Kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais pirmosios pagalbos teikimą, vaistinių preparatų laikymą, apskaitą ir farmacinių atliekų tvarkymą.
5. Kauno lopšelis-darželis „Šarkelė“, vykdantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pirmosios pagalbos rinkinyje turi turėti ne mažiau kaip vieną 150 mikrogramų epinefrino injekciniu tirpalu užpildytą švirkštiklį (autoinjektorių), skirtą vaikams, sveriantiems iki 30 kg.
6. Jeigu Kauno lopšelyje-darželyje „Šarkelė“ tuo pačiu adresu yra daugiau kaip vienas pirmosios pagalbos rinkinys, epinefrinas laikomas viename, aiškiai pažymėtame pirmosios pagalbos rinkinyje.
7. Kauno lopšelio-darželio „Šarkelė“ darbuotojai privalo vadovautis principu, kad anafilaksijos atveju pagalba turi būti pradėta kuo anksčiau ir negali būti atidėliojama laukiant vaiko tėvų (globėjų), visuomenės sveikatos specialisto ar kito darbuotojo atvykimo.

II SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS

8. **Anafilaksija** – sunki, greitai progresuojanti, gyvybei pavojinga sisteminė alerginė reakcija, kuriai būtina skubi pagalba.
9. **Epinefrino autoinjektorius** – vienkartinis prietaisas, kuriame yra fiksuota epinefrino dozė ir kuris skirtas skubiam epinefrino suleidimui į raumenis, į išorinę šlaunies dalį, anafilaksijos atveju.
10. **Pirmosios pagalbos rinkinyje laikomas epinefrinas** – Kauno lopšelio-darželio „Šarkelė“ įsigytas bendro naudojimo epinefrino autoinjektorius, skirtas panaudoti anafilaksijos atveju įstaigoje esančiam asmeniui.
11. **Individualus epinefrino autoinjektorius** – konkrečiam vaikui gydytojo rekomenduotas ir vaiko tėvų (globėjų) parūpintas epinefrino autoinjektorius.

III SKYRIUS
ANAFILAKSIJOS POŽYMIAI

12. Anafilaksiją galima įtarti, kai po kontakto su galimu alergenu, pavyzdžiui, maistu, vaistu ar vabzdžio įgėlimo, vaikui greitai atsiranda vienas ar keli šie požymiai:

12.1. pasunkėjęs arba triukšmingas kvėpavimas;

12.2. švokštimas, dusulys, kosulys;

12.3. gerklės veržimo, gerklės ar liežuvio tinimo pojūtis;

12.4. balso pasikeitimas, užkimimas;

12.5. rijimo pasunkėjimas;

12.6. lūpų, liežuvio, veido ar gerklės tinimas;

12.7. staigus išplitęs dilgėlinis bėrimas ar paraudimas, ypač kartu su kitais sisteminiais simptomais;

12.8. staigus blyškumas, silpnumas;

12.9. svaigimas, sąmonės pritemimas ar netekimas;

12.10. staigus kraujospūdžio kritimui būdingas silpnumas ar kolapsas;

12.11. pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas ar kiti ryškūs virškinimo sistemos simptomai kartu su kitais anafilaksijos požymiais.

13. Anafilaksija gali pasireikšti ir be odos bėrimo.

14. Jeigu kyla pagrįstas įtarimas dėl anafilaksijos, darbuotojas neturi laukti, kol atsiras visi galimi požymiai.

15. Kilus pagrįstam įtarimui dėl anafilaksijos, pirmenybė teikiama skubiosios medicinos pagalbos iškvietimui ir ankstyvam epinefrino panaudojimui pagal pirmosios pagalbos principus bei konkretaus preparato naudojimo instrukciją.

IV SKYRIUS
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „Šarkelė“ DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ALGORITMAS ANAFILAKSIJOS ATVEJU

16. Nustačius arba įtarus anafilaksiją, Kauno lopšelio-darželio „Šarkelė“ darbuotojas veikia šia seka:

1 etapas. Įvertinti situaciją

17. Darbuotojas įvertina vaiko būklę ir galimą anafilaksiją.

2 etapas. Kviesti 112

18. Nedelsiant skambinama telefono numeriu **112** ir pranešama:

„Vaikui įtariama anafilaksija. Reikalinga skubioji medicinos pagalba.“

19. Dispečeriui nurodoma:

19.1. Kauno lopšelio-darželio „Šarkelė“ pavadinimas;

19.2. tikslus įstaigos adresas;

19.3. įėjimas į pastatą ir kita informacija, reikalinga greitajai medicinos pagalbai patekti;

19.4. vaiko amžius;

19.5. pagrindiniai simptomai;

19.6. ar vaikas sąmoningas ir kvėpuoja;

19.7. ar epinefrinas jau panaudotas ir kada;

19.8. kita dispečerio prašoma informacija.

3 etapas. Panaudoti epinefrino autoinjektorių

20. Jeigu yra anafilaksijos požymių ir epinefrino panaudojimas būtinas, darbuotojas, vykdydamas 112 dispečerio nurodymus ir vadovaudamasis šiuo Aprašu, nedelsdamas panaudoja Kauno lopšelio-darželio „Šarkelė“ pirmosios pagalbos rinkinyje esantį epinefrino autoinjektorių.

21. Autoinjektorius naudojamas pagal konkretaus preparato pakuotės lapelyje nurodytą naudojimo tvarką ir darbuotojų pirmosios pagalbos mokymų metu išmoktą praktinę seką.

22. Epinefrinas suleidžiamas į išorinę šlaunies dalį pagal konkretaus preparato naudojimo instrukciją.

23. Panaudotas autoinjektorius saugiai padedamas taip, kad nekeltų sužalojimo pavojaus, ir išsaugomas apskaitai bei tolesniam sutvarkymui.

4 etapas. Užtikrinti tinkamą vaiko padėtį

24. Vaikas nepaliekamas vienas ir jam neleidžiama vaikščioti ar stotis.

25. Jei vaikas sąmoningas, jis guldomas.

26. Jei vaikui sunku kvėpuoti ir gulima padėtis blogina būklę, leidžiama pasirinkti padėtį, kurioje kvėpuoti lengviau, tačiau vaikas turi būti nuolat stebimas.

27. Jei vaikas vemia arba yra be sąmonės, bet kvėpuoja, jis paguldomas į stabilią šoninę padėtį.

5 etapas. Stebėti gyvybines funkcijas

28. Darbuotojas nuolat stebi:

28.1. sąmonę;

28.2. kvėpavimą;

28.3. vaiko būklės pokyčius;

28.4. pakartotinius ar stiprėjančius simptomus.

29. Jei vaikas nustoja normaliai kvėpuoti arba nėra gyvybės požymių, nedelsiant pradedamas pradinis gaivinimas pagal pirmosios pagalbos mokymuose įgytą kompetenciją ir vykdomi 112 dispečerio nurodymai.

6 etapas. Tėvų (globėjų) informavimas

30. Iškvietus skubiąją medicinos pagalbą ir pradėjus teikti pirmąją pagalbą, informuojami vaiko tėvai (globėjai).

7 etapas. Vaiko perdavimas medikams

31. Atvykus greitosios medicinos pagalbos darbuotojams, vaiką ir informaciją apie suteiktą pirmąją pagalbą jiems perduoda vaiko būklę prižiūrėjęs darbuotojas arba kitas įstaigos vadovo paskirtas darbuotojas.

32. Medikams perduodama informacija apie:

32.1. galimą alergeną, jeigu jis žinomas;

32.2. simptomų pradžios laiką;

32.3. epinefrino panaudojimo laiką;

32.4. panaudoto preparato stiprumą;

32.5. kitas suteiktas pirmosios pagalbos priemones;

32.6. žinomą vaiko individualų savirūpos planą, jeigu toks yra.

V SKYRIUS
DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖS

33. Kauno lopšelio-darželio „Šarkelė“ direktorius:

33.1. tvirtina šį Aprašą;

33.2. paskiria vieną ar daugiau atsakingų darbuotojų už pirmosios pagalbos rinkinio ir epinefrino priežiūrą;

33.3. užtikrina, kad įstaiga turėtų teisės aktuose nustatytą pirmosios pagalbos rinkinio sudėtį;

33.4. užtikrina darbuotojų supažindinimą su šiuo Aprašu;

33.5. užtikrina darbuotojų pirmosios pagalbos mokymų organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

33.6. užtikrina, kad darbuotojams būtų žinoma epinefrino laikymo vieta;

33.7. užtikrina, kad pirmosios pagalbos organizavimo tvarka būtų suderinta su kitomis įstaigoje galiojančiomis tvarkomis;

33.8. organizuoja Aprašo peržiūrą, kai pasikeičia teisės aktai arba įstaigos veiklos sąlygos.

34. Atsakingas asmuo už pirmosios pagalbos rinkinį ir epinefriną:

34.1. užtikrina pirmosios pagalbos rinkinio papildymą ir atnaujinimą;

34.2. tikrina epinefrino kiekį;

34.3. tikrina epinefrino tinkamumo vartoti terminą;

34.4. tikrina, ar epinefrino tirpalas yra skaidrus ir bespalvis;

34.5. užtikrina epinefrino laikymą pagal gamintojo nustatytas sąlygas;

34.6. užtikrina, kad epinefrinas būtų laikomas išorinėje pakuotėje ir apsaugotas nuo šviesos;

34.7. užtikrina, kad epinefrinas būtų laikomas ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, nebūtų šaldomas ar užšaldomas;

34.8. vykdo epinefrino apskaitą;

34.9. registruoja epinefrino panaudojimą;

34.10. užtikrina panaudoto, nekokybiško ar pasibaigusio tinkamumo vartoti termino epinefrino pašalinimą iš pirmosios pagalbos rinkinio;

34.11. užtikrina, kad netinkamas epinefrinas būtų tvarkomas kaip farmacinė atlieka teisės aktų nustatyta tvarka;

34.12. po epinefrino panaudojimo nedelsdamas inicijuoja jo papildymą;

34.13. prireikus teikia įstaigos direktoriui informaciją apie pirmosios pagalbos rinkinio ir epinefrino būklę.

35. Pedagoginiai darbuotojai, mokytojų padėjėjai ir kiti pirmąją pagalbą privalantys teikti Kauno lopšelio-darželio „Šarkelė“ darbuotojai:

35.1. turi žinoti šio Aprašo nuostatas;

35.2. turi žinoti pirmosios pagalbos rinkinio ir epinefrino laikymo vietą;

35.3. kritinės būklės atveju privalo nedelsdami imtis pirmosios pagalbos veiksmų pagal savo kompetenciją;

35.4. įtarę anafilaksiją nedelsdami kviečia skubiąją medicinos pagalbą telefonu 112;

35.5. esant būtinybei ir pagal šį Aprašą bei konkretaus preparato naudojimo instrukciją panaudoja epinefrino autoinjektorių;

35.6. nepalieka anafilaksijos požymių turinčio vaiko vieno;

35.7. suteikia skubiosios medicinos pagalbos darbuotojams visą žinomą informaciją apie vaiko būklę ir suteiktą pagalbą;

35.8. informuoja atsakingą asmenį ir įstaigos direktorių apie epinefrino panaudojimą.

36. Visuomenės sveikatos specialistas, jeigu jis yra Kauno lopšelyje-darželyje „Šarkelė“ įvykio metu:

36.1. pagal galimybes nedelsdamas informuojamas apie įvykį;

36.2. pagal savo kompetenciją prisideda prie pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo;

36.3. bendradarbiauja su darbuotojais ir skubiosios medicinos pagalbos tarnyba;

36.4. dalyvauja analizuojant įvykį ir, esant poreikiui, inicijuoja pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos tobulinimą.

VI SKYRIUS
EPINEFRINO LAIKYMO TVARKA

37. Kauno lopšelyje-darželyje „Šarkelė“ epinefrino laikymo vieta:

37.1. turi būti vaikams nepasiekiama;

37.2. turi būti greitai pasiekiama pirmąją pagalbą teikti apmokytiems darbuotojams;

37.3. turi būti aiškiai pažymėta;

37.4. neturi būti tokioje vietoje, kur dėl užrakto, rakto paieškos ar kitos kliūties epinefrino nebūtų galima greitai paimti.

38. Įstaigoje nustatoma ši epinefrino laikymo vieta:

Patalpa: Administracijos korpusas

Pirmosios pagalbos rinkinys.

Žymėjimas: Nurodytas -

39. Epinefrinas laikomas gamintojo išorinėje pakuotėje kartu su pakuotės lapeliu.

40. Epinefrinas laikomas ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, nešaldomas ir neužšaldomas.

41. Atsakingas asmuo periodiškai patikrina:

41.1. galiojimo terminą;

41.2. pakuotės būklę;

41.3. tirpalo išvaizdą;

41.4. laikymo sąlygas;

41.5. autoinjektoriaus prieinamumą.

42. Jeigu tirpalas tapo spalvotas, susidrumstė, jame atsirado dalelių arba pasibaigė tinkamumo vartoti laikas, autoinjektorius nenaudojamas ir išimamas iš pirmosios pagalbos rinkinio.

VII SKYRIUS
EPINEFRINO ĮSIGIJIMAS

43. Epinefriną Kauno lopšelis-darželis „Šarkelė“ įsigyja vaistinėje teisės aktų nustatyta tvarka.

44. Atsakingas darbuotojas, vadovaudamasis Kauno lopšelio-darželio „Šarkelė“ direktoriaus patvirtintu pavedimu arba įgaliojimu, organizuoja epinefrino įsigijimą.

45. Įstaigos direktorius išduoda įgaliojimą konkrečiam darbuotojui, kuris epinefriną įsigyja vaistinėje.

VIII SKYRIUS
EPINEFRINO APSKAITA

46. Epinefrino apskaita vykdoma popieriniame arba elektroniniame laisvos formos žurnale.

47. Skirtingų stiprumų epinefrino apskaitos duomenys pildomi atskirai, jeigu įstaigoje laikomi skirtingo stiprumo autoinjektoriai.

48. Apskaitos žurnale registruojama:

48.1. įsigijimo data;

48.2. preparato pavadinimas ir stiprumas;

48.3. preparato serija;

48.4. tinkamumo vartoti terminas;

48.5. įsigytų autoinjektorių kiekis;

48.6. panaudojimo data;

48.7. panaudoto autoinjektoriaus kiekis;

48.8. panaudojimo priežastis;

48.9. asmens, kuriam panaudotas epinefrinas, vardas ir pavardė;

48.10. netinkamo naudoti autoinjektoriaus kiekis;

48.11. išėmimo iš pirmosios pagalbos rinkinio data;

48.12. perdavimo šalinti data;

48.13. perduotų šalinti autoinjektorių skaičius;

48.14. subjektas, kuriam perduota;

48.15. atsakingo asmens parašas arba elektroninis patvirtinimas.

IX SKYRIUS
VEIKSMAI PO EPINEFRINO PANAUDOJIMO

49. Po epinefrino panaudojimo:
    49.1. vaikas perduodamas skubiosios medicinos pagalbos darbuotojams;
    49.2. informuojami vaiko tėvai (globėjai);
    49.3. informuojamas įstaigos direktorius;
    49.4. informuojamas atsakingas asmuo už pirmosios pagalbos rinkinio priežiūrą;
    49.5. panaudotas autoinjektorius registruojamas apskaitos žurnale;
    49.6. įvertinama, ar būtina papildyti pirmosios pagalbos rinkinį;
    49.7. užtikrinamas naujo epinefrino autoinjektoriaus įsigijimas teisės aktų nustatyta tvarka.
50. Panaudotas autoinjektorius nėra grąžinamas į pirmosios pagalbos rinkinį.
51. Panaudotas, nekokybiškas arba pasibaigusio tinkamumo vartoti termino epinefrinas tvarkomas pagal farmacinių atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

X SKYRIUS
DOKUMENTAVIMAS IR ĮVYKIO ANALIZĖ

52. Kiekvienas epinefrino panaudojimo atvejis dokumentuojamas apskaitos žurnale.
53. Kauno lopšelio-darželio „Šarkelė“ direktorius gali organizuoti įvykio analizę, kurios tikslas – nustatyti, ar pirmoji pagalba buvo suteikta laiku ir ar reikia keisti organizacines priemones.
54. Analizuojant įvykį vertinama:
    54.1. kada pastebėti pirmieji simptomai;
    54.2. kada iškviesta 112;
    54.3. kada panaudotas epinefrinas;
    54.4. ar epinefrinas buvo lengvai pasiekiamas;
    54.5. ar darbuotojai žinojo jo laikymo vietą;
    54.6. ar buvo laikomasi šio Aprašo;
    54.7. ar reikalingi papildomi darbuotojų mokymai;
    54.8. ar reikia pakeisti pirmosios pagalbos rinkinio laikymo vietą ar žymėjimą.

XI SKYRIUS
DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR INFORMAVIMAS

55. Kauno lopšelio-darželio „Šarkelė“ darbuotojai supažindinami su šiuo Aprašu pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis.
56. Darbuotojams turi būti sudarytos sąlygos susipažinti su:
    56.1. anafilaksijos požymiais;
    56.2. 112 iškvietimo tvarka;
    56.3. epinefrino laikymo vieta;
    56.4. epinefrino autoinjektoriaus naudojimo principais;
    56.5. konkretaus įstaigoje naudojamo autoinjektoriaus pakuotės lapeliu;
    56.6. veiksmų seka iki skubiosios medicinos pagalbos atvykimo.
57. Praktinius veiksmus su autoinjektoriumi rekomenduojama mokytis naudojant mokomąjį (treniruočių) autoinjektorių.
58. Darbuotojų pirmosios pagalbos mokymai organizuojami teisės aktų nustatyta tvarka.
59. Darbuotojas, pradėjęs dirbti Kauno lopšelyje-darželyje „Šarkelė“, turi būti supažindintas su šiuo Aprašu ir pirmosios pagalbos rinkinio bei epinefrino laikymo vieta.

XII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

60. Už šio Aprašo įgyvendinimą atsako Kauno lopšelio-darželio „Šarkelė“ direktorius ir jo paskirti atsakingi asmenys pagal jiems priskirtas funkcijas.

61. Visi Kauno lopšelio-darželio „Šarkelė“ darbuotojai privalo laikytis šio Aprašo ir kitų įstaigoje patvirtintų pirmosios pagalbos organizavimo dokumentų.

62. Šis Aprašas peržiūrimas ir, esant poreikiui, atnaujinamas pasikeitus teisės aktams, įstaigos veiklos sąlygoms, pirmosios pagalbos rinkinio sudėčiai arba įvykus anafilaksijos atvejui.

63. Jeigu šio Aprašo nuostatos prieštarauja vėliau priimtiems teisės aktams, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos, o Aprašas atitinkamai atnaujinamas.

1 PRIEDAS

DARBUOTOJO VEIKSMŲ ANAFILAKSINIO ŠOKO ATVEJU ATMINTINĖ
ĮTARIAMAS ANAFILAKSINIS ŠOKAS?

NEDELSDAMAS VEIK:

1. **ATPAŽINK**

- pasunkėjęs kvėpavimas;
- gerklės / liežuvio tinimas;
- švokštimas;
- balso pasikeitimas;
- staigus silpnumas, blyškumas, sąmonės pritemimas;
- išplitusi alerginė reakcija kartu su kitais sisteminiais požymiais.

2. **SKAMBINK 112**

Pasakyk:

„Įtariama anafilaksija."

3. **PANAUDOK EPINEFRINĄ**

Panaudok įstaigos autoinjektorių pagal skubiosios medicinos pagalbos dispečerio nurodymus, konkretaus preparato instrukciją ir mokymų metu išmoktą tvarką.

4. **NEPALIK VAIKO VIENO**
5. **NELEISK VAIKUI VAIKŠČIOTI AR STOTIS.**
6. **STEBĖK KVĖPAVIMĄ IR SĄMONĘ**
7. **JEI BŪKLĖ BLOGĖJA**

Vadovaukis 112 dispečerio nurodymais ir pirmosios pagalbos mokymuose įgytais įgūdžiais.

8. **INFORMUOK TĖVUS / GLOBĖJUS**
9. **PERDUOK VAIKĄ MEDIKAMS**
10. **PRANEŠK ĮSTAIGOS VADOVUI IR ATSAKINGAM ASMENIUI**

2 PRIEDAS

EPINEFRINO APSKAITOS ŽURNALAS

Įstaigos pavadinimas: _____

Adresas: _____

Pirmosios pagalbos rinkinio vieta: _____

Epinefrino stiprumas: 150 mikrogramai

EIL.Nr.	Įsigijimo data	Serija	Tinka iki	Įsigyta vnt.	Panaudojimo data	Panaudota vnt.	Panaudojimo priežastis	Asmens, kuriam panaudota, vardas, pavardė	Likutis	Atsakingo asmens parašas
.										
.										
.										

NETINKAMO NAUDOTI EPINEFRINO APSKAITA

Eil. Nr.	Preparato serija	Tinka iki	Kiekis	Išėmimo iš rinkinio data	Perdavimo šalinti data	Kam perduota	Perdavimo dokumentas / pastabos	Atsakingo asmens parašas
.								
.								

3 PRIEDAS

DARBUOTOJO SUPAŽINDINIMO SU EPINEFRINO NAUDOJIMO TVARKA LAPAS

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad:

- susipažinau su „Epinefrino naudojimo anafilaksinio šoko atveju ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje tvarkos aprašu“;
- žinau anafilaksijos pagrindinius požymius;
- žinau, kad anafilaksijos atveju būtina nedelsiant kviesti 112;
- žinau pirmosios pagalbos rinkinio ir epinefrino laikymo vietą;
- žinau, kad epinefrinas naudojamas anafilaksijos atveju;
- susipažinau su įstaigoje naudojamo epinefrino autoinjektoriaus naudojimo instrukcija;
- žinau, kad vaiko negalima palikti vieno;
- žinau, kad po epinefrino panaudojimo būtina užtikrinti medicininės pagalbos suteikimą ir informuoti atsakingus asmenis.